

研究・調査報告書

報告書番号	担当
71	滋賀医科大学社会医学講座福祉保健医学部門
題名（原題／訳）	
The risk of acute myocardial infarction after stopping drinking 禁酒後の急性心筋梗塞罹患のリスク	
執筆者	
Negri E, La Vecchia C, Pelucchi C, Tarani A	
掲載誌（番号又は発行年月日）	
Prev Med, 2005 Jun; 40(6): 725-8	
キーワード	
飲酒、禁酒、急性心筋梗塞に対する予防効果	
要旨	
1995 年から 1999 年にかけ、ミラノ近郊の病院に入院した急性心筋梗塞患者 507 名および対照 478 人に行ったアンケート調査に基づき、禁酒の急性心筋梗塞発症に与えるリスクについて検討した。これまで飲酒したことのない群を基準とすると、急性心筋梗塞罹患のオッズ比は、飲酒者で 0.56 (95%CI:0.41-0.84)、禁酒者で 0.65(0.37-1.15)であった。同様に、禁酒 1 年では 2.10(0.40-11.1), 2-4 年では 0.64(0.19-2.16), 5-14 年では 0.46(0.18-1.2), 15 年以上禁酒では 0.78(0.27-2.27) であった。以上より、禁酒してから数年間は、アルコールの急性心筋梗塞発症に対する予防効果は持続するのではないかということが示された。	